Les Amphibiens en Auvergne

Parmi les espèces emblématiques de nos mares figurent bien sûr les amphibiens.

Voici un petit tour d'horizon Grenouille des richesses batrachologiques qu'offre notre région.



 l'habitat aquatique (mares, étangs, rivières...), lieu de reproduction, d'alimentation et d'hibernation:

-l'habitatterrestre(berges, bois, prairies...), lieu d'alimentation et d'hibernation,

Tētards.

Si chaque espèce est dépendante du milieu aquatique, notamment pour le développement de ses tétards, la période de fréquentation de la mare et le type de mare fréquentée diffèrent selon les espèces. Très peu d'amphibiens adultes prolongent réellement leur séjour aquatique.

Ainsi, la première à venir déposer ses œufs dès le mois de février est en général la grenouille rousse. On ne la reverra plus sur le bord des mares à partir du printemps. Les tritons arrivent également tôt dans la saison et demeurent discrètement dans le fond des eaux tout le printemps, lls quittent souvent les lieux en été.

Le sonneur à ventre jaune se distingue en choisissant des petites zones d'eau peu végétalisées, parfois temporaires, comme des ornières, qu'il fréquente à partir du mois de mai, juin. La salamandre ne s'approche des mares que pour venir pondre ; ne mettez jamais une salamandre adulte dans l'eau, elle pourrait se noyer.



Ci-contre: Larve de Salamandre.



Crapaud

calamite.

Les Anoures Grenouilles, Crapauds et Rainettes

11 espèces en Auvergne :

Grenouille verte, Grenouille rieuse, Grenouille de Lessonae, Grenouille agile, Grenouille rousse, Crapaud commun, Crapaud calamite, Alyte accoucheur, Sonneur à ventre jaune, Pélodyte ponctué, Rainette verte.

 Forme des pontes caractéristique des espèces : déposées sous forme de paquets gélatineux chez les grenouilles ou de chapelets chez la plupart des crapauds.

II existe deux types d'amphibiens :

- · les anoures dont les adultes ne possèdent pas de queue,
- les urodèles dont les adultes possèdent une queue.


Les Urodèles : Salamandres et Tritons

6 espèces en Auvergne :

Salamandre tachetée, Triton alpestre, Triton crété, Triton marbré, Triton ponctué, Triton palmé. Le Triton de Blasius n'est pas une espèce mais un hybride issu de l'accouplement du Triton crété et du Triton marbré. Stérile, il est répertorié sur 3 mares dans l'Allier.

 Différents des Anoures par la présence d'une queue chez l'adulte : aplatie latéralement chez le Triton adulte et ronde chez la Salamandre adulte.





Toutes les espèces d'amphibiens sont protégées en France.

La destruction, le transport des espèces et pontes ainsi que l'altération de leurs habitats sont strictement interdits. Seules les grenouilles rousse et verte sont pêchables à certaines périodes de l'année, variables selon les régions, et uniquement pour une consommation "familiale". Leur muti-



Le cycle de vie des Urodèles est très proche de celui des Anoures, mais la phase terrestre est plus importante.